

N3 – FRACTIONS EGYPTIENNES

TI-82 Stats – TI-83 Plus – TI-84 Plus

Mots-clés : fraction, fraction unitaire, algorithme, nombre rationnel, partie entière.

1. Objectifs

Pgcd, ppcm, maîtriser les calculs sur les fractions : réduire au même dénominateur, simplification.

Réfléchir sur des pratiques issues de situations historiques. Travailler avec de grands nombres.

2. Énoncé

Voir fiche élève.

3. Résolution

Nous ne connaissons pas la méthode utilisée par les Égyptiens pour décomposer toute fraction en une somme de fractions unitaires. En 1201, Fibonacci (Léonard de Pise 1175-1250) trouve un algorithme, qu'il décrit sans démonstration dans son livre *Liber abaci* paru en 1202.

En gros il dit : « Soustraire à la fraction donnée la plus grande fraction égyptienne possible, répéter l'opération avec la nouvelle fraction, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'opération donne une fraction égyptienne. »

La méthode, donnée dans la fiche élève, a été redécouverte en 1880 par James Sylvester. On appelle cette méthode « **algorithme glouton** » de **Fibonacci-Sylvester**.

James Sylvester a démontré que l'algorithme donne bien une décomposition en un nombre fini de fractions unitaires :

en effet, si la décomposition est terminée (fraction unitaire) il n'y a rien à démontrer. Sinon, en supposant le reste $\frac{a}{b} - \frac{1}{n} = \frac{n \times a - b}{n \times b}$ non unitaire, comme $\frac{a}{b} = \frac{n \times a}{n \times b}$, la fraction $\frac{n \times a - b}{n \times b}$ possède un plus petit numérateur (entier positif) et un même dénominateur que la précédente. Donc cela va s'arrêter.

On pourra faire remarquer aux élèves que :

✓ La solution n'est pas unique... par exemple, comme $\frac{1}{n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$ on obtient deux écritures

d'une même quantité (avec des fractions unitaires).

✓ l'algorithme ne donne pas forcément la « meilleure » solution (les égyptiens écrivaient la solution contenant le minimum de sommes possible).

1) a) $\frac{17}{18} - \frac{1}{2} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$. Cette fraction n'étant pas unitaire, on recommence : $\frac{1}{3} < \frac{4}{9} < \frac{1}{2}$ et $\frac{4}{9} - \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$.

Ce reste est une fraction unitaire. Finalement : $\frac{17}{18} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9}$.

b) On a : $\frac{63}{63} < \frac{91}{63} < \frac{126}{63}$, soit $1 < \frac{91}{63} < 2$; d'où $\frac{1}{2} < \frac{63}{91} < 1$. Remarquons que $\text{int}(\frac{91}{63}) = 1$ et que l'on

choisit : $n + 1 = 2$ comme dénominateur. Alors, $\frac{63}{91} - \frac{1}{2} = \frac{5}{26}$. Comme $\frac{5}{26}$ n'est pas unitaire, on continue.

$\text{int}(\frac{26}{5}) = 5$; $5 + 1 = 6$; $\frac{5}{26} - \frac{1}{6} = \frac{1}{39}$, qui est unitaire. On peut conclure : $\frac{63}{91} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{39}$.

c) $\text{int}(\frac{127}{41}) = 3$; $\frac{41}{127} - \frac{1}{4} = \frac{37}{508}$; $\text{int}(\frac{508}{37}) = 13$; $\frac{37}{508} - \frac{1}{14} = \frac{5}{3556}$;

$\text{int}(\frac{3556}{5}) = 711$; $\frac{5}{3556} - \frac{1}{712} = \frac{1}{632968}$, qui est unitaire, donc : $\frac{41}{127} = \frac{1}{4} + \frac{1}{14} + \frac{1}{712} + \frac{1}{632968}$.

e) Si l'on applique l'algorithme on trouve par un beau calcul et de jolies réductions au même dénominateur :

$\frac{773}{1860} = \frac{1}{3} + \frac{1}{13} + \frac{1}{188} + \frac{1}{63136} + \frac{1}{11958779170}$.

d) En appliquant l'algorithme, on trouve : $\frac{523}{770} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{80} + \frac{1}{18480}$.

Curieusement, ici, les égyptiens commencent par écrire : $\frac{523}{770} = \frac{1}{2} + \frac{1}{7} + \frac{2}{55}$, puis sachant que $55 = 5 \times 11$ et que $\frac{2}{p \times q} = \frac{1}{\frac{p+q}{2} \times q} + \frac{1}{p \times \frac{p+q}{2}}$, $\frac{523}{770} = \frac{1}{2} + \frac{1}{7} + \frac{1}{\frac{5+11}{2} \times 11} + \frac{1}{5 \times \frac{5+11}{2}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{7} + \frac{1}{40} + \frac{1}{88}$.

Leurs fractions ont de plus petits dénominateurs (sauf une), des calculs plus simples. La démarche adoptée par les égyptiens nous échappe ici.

De même, ils trouvent $\frac{4}{65} = \frac{1}{26} + \frac{1}{65} + \frac{1}{130}$. Essayer l'algorithme pour $\frac{4}{65}$ et comparer.

2) a) $\frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} < \frac{4}{5} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{10}$ et b) $\frac{9}{13} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{39} < \frac{53}{88} = \frac{1}{2} + \frac{1}{10} + \frac{1}{440}$.

3) a) $\frac{11}{12} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12}$. Il partage six tartes en deux (il reste cinq tartes) et quatre tartes en trois (il reste alors une tarte). Cette tarte restante est enfin partagée en douze.

b) $\frac{7}{8} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8}$. Il partage donc sept en quatre, deux et un.

c) $\frac{17}{18} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{9}{18} + \frac{6}{18} + \frac{2}{18}$. Il partage donc dix-sept en neuf, six et deux.



4. Compléments

On peut, avec les élèves, programmer l'algorithme de décomposition.

Toutefois, la programmation sur calculatrice numérique (TI 82 stat, 83 et 84) peut ne pas donner le résultat souhaité car, d'une part, la calculatrice travaille sur des approximations et d'autre part, la transformation d'une valeur approchée en fraction (instruction Frac) n'est pas toujours possible (en particulier, quand le dénominateur dépasse 9 999. Dans ce cas, l'affichage reste une approximation numérique.



Le programme suivant donne un résultat parfait pour $\frac{17}{18}$. En revanche, pour $\frac{19}{18} = 1 + \frac{1}{18}$, la machine donne un résultat surprenant qui montre les limites du calcul approché.

Le programme	Commentaires	Le programme (suite)	Commentaires
<pre> Cl rHome Di sp "FRACTION ?" Input A {int(A)}úáE If int(A)=A Then Di sp A El se int(A)úC If Cú1 Then Di sp C A-CúA End While (A^ú1)øint(A^ú1) int(A^ú1)+1úB augment(áE, {1/B})úáE Di sp 1/BáFrac </pre>	<p>Initialiser la liste. Si c'est un entier... pas grand chose à faire !</p> <p>Si l'utilisateur propose un rationnel supérieur à 1.</p> <p>Le traitement, conformément à l'algorithme proposé. C'est une boucle While (Faire tant que). Il faudrait une boucle Repeat</p>	<pre> A-1/BúA Pause If A=0: Stop If A<1ú13 Then Di sp "RESTE TRES PETIT", A Stop End If A<5ú4 Then Di sp "HORS LIMITE FRAC", A Stop End augment(áE, {A})úáE Di sp AáFrac End </pre>	<p>(Faire jusqu'à ce que). Il manquera le dernier résultat.</p> <p>Ce sont des approximations ; si le reste est proche de 0, on devrait pouvoir supposer que c'est 0.</p> <p>Le reste est inférieur à ce qu'il est possible de traiter.</p> <p>Ne pas oublier le dernier résultat.</p>



Faire la différence entre un entier (partie entière) et un résultat (une approximation) ne donne pas forcément un résultat exact.

Essayer $\frac{1}{18}$ qui va très bien. Approximations... !



Même problème, travailler sur des approximations et ne pas avoir une fonction de transformation sous forme rationnelle (fraction) suffisamment performante (dénominateur limité).

On remarquera que $2.9669... \times 10^{-6}$ est une bonne


approximation de $\frac{1}{337050}$.

ANNEXE

Programmer sur calculatrice formelle (TI 89, V200) est plus agréable et plus performant. Le traitement des entiers (forme exacte jusqu'à six cent chiffres !) permet un meilleur comportement de l'algorithme qui est appliqué « jusqu'au bout ».

Si l'on veut appliquer un développement en fractions égyptiennes à un nombre décimal, il suffit de l'écrire sous forme fractionnaire ; par exemple 0,222 sera écrit $\frac{222}{1000}$ ou $\frac{111}{500}$.

Le programme	Commentaires
<pre>frac_egy (nb) Prgm ClrIO:local b,c Disp "Décomposition égyptienne de ":"Disp nb {}»egypt If int(nb)=nb Then augment(egypt,{nb})»egypt Disp "nb entier" Else int(nb)»c If c≥1 Then augment(egypt,{c})»egypt nb-c»nb EndIf While nb^(a1) int(nb^(a1)) int(nb^(a1))+1»b augment(egypt,{1/b})»egypt nb-1/b»nb EndWhile augment(egypt,{nb})»egypt EndIf Disp egypt Pause :DispHome EndPrgm</pre>	<p>Initialisation de la liste.</p> <p>Boucle While...</p> <p>Ne pas oublier le dernier résultat.</p> <p>Affichage.</p>



Taper 123/321 est facile au clavier.
La V200 transforme 123/321 en 41/107
fraction irréductible !

De même pour $0.222 = 222/1000 = 111/500$.
On remarquera qu'il faut utiliser des nombres
rationnels. Passer en mode numérique (entrée
de décimaux) donne des résultats numériques
(et il n'y a pas de fonction Frac).

Bibliographie

Cette activité a été réalisée à partir d'un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, traitant du papyrus de Rhind et des fractions égyptiennes :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Papyrus_Rhind http://fr.wikipedia.org/wiki/Fraction_%C3%A9gyptienne.

Nom :

Classe :

N3 – FRACTIONS EGYPTIENNES

Dans l'Égypte des pharaons, toute fraction devait être une fraction unitaire¹ ou s'écrire comme somme de fractions unitaires. Cette écriture est une décomposition en fractions égyptiennes.

Nous ne connaissons pas la méthode utilisée par les égyptiens...

En 1201, Fibonacci (Léonard de Pise 1175-1250) trouve un algorithme pour effectuer une telle décomposition. La méthode a été redécouverte en 1880 par James Sylvester :

On considère un nombre rationnel $\frac{a}{b}$ inférieur à 1 ; si ce n'est pas le cas, lui enlever sa partie entière.

- si $a = 1$, la décomposition est terminée.
sinon chercher le plus petit entier n tel que $\frac{a}{b} \geq \frac{1}{n}$.
- si le reste $\frac{a}{b} - \frac{1}{n} = \frac{n \times a - b}{n \times b}$ est unitaire c'est fini. Sinon recommencer avec $\frac{n \times a - b}{n \times b}$.

1) Décomposer des fractions :

a) On se propose de décomposer $\frac{17}{18}$ en fractions égyptiennes.

On compare la fraction donnée aux fractions de numérateur 1 et de dénominateurs successifs $n = 1$ puis 2 puis 3... et on la coince entre deux fractions unitaires consécutives ; on a immédiatement :

$$\frac{1}{2} < \frac{17}{18} < \frac{1}{1}. \text{ Déterminer alors la fraction } \frac{a}{b} \text{ telle que } \frac{17}{18} = \frac{1}{2} + \frac{a}{b}.$$

Cette fraction est-elle unitaire ? Sinon, recommencer pour la décomposer en une somme de fractions unitaires.

$$\text{Démontrer que : } \frac{17}{18} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9}.$$

b) On se propose de décomposer $\frac{63}{91}$ en fractions égyptiennes.

Pour faciliter la recherche, améliorons la méthode :

On remarque que si $\frac{a}{b}$ n'est pas unitaire et que $\frac{1}{n+1} < \frac{a}{b} < \frac{1}{n}$, alors $n < \frac{b}{a} < n+1$.

Or le plus petit entier inférieur ou égal à $\frac{b}{a}$ est la partie entière de $\frac{b}{a}$. Il est ainsi plus facile de calculer les différents dénominateurs (ce qui n'empêchera pas de calculer les différences, les mises aux mêmes dénominateurs, etc.).

Déterminer deux entiers consécutifs qui encadrent $\frac{91}{63}$. En déduire un encadrement de $\frac{63}{91}$ par deux fractions unitaires consécutives. Opérer alors comme dans la question 1.

$$\text{Démontrer que : } \frac{63}{91} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{39}.$$

c) Décomposer $\frac{41}{127}$ en fractions égyptiennes.

d) Décomposer $\frac{773}{1860}$ en fractions égyptiennes.

e) Décomposer $\frac{523}{770}$ en fractions égyptiennes.

¹ Une fraction unitaire est une fraction dont le numérateur est égal à 1.

